

Seguridad de las ARV durante el embarazo

Las mujeres embarazadas que tienen el VIH toman medicinas antirretrovíricas (antiretroviral medicines, ARV) para proteger su salud y la salud de su bebé. En Estados Unidos, en un 99 % de los casos en los que la madre toma ARV durante el embarazo, el bebé no nace con el virus.

Resultados



Después de que un bebé queda expuesto a las ARV en el vientre o al nacer, nuestro estudio hace el seguimiento del niño durante su crecimiento para determinar si las ARV afectan su salud de alguna manera.

En nuestro estudio hemos encontrado que por lo general la administración de ARV durante el embarazo no es perjudicial para las madres ni para los bebés.



Sin embargo, algunos bebés expuestos a ciertas ARV podrían nacer prematuramente o con bajo peso. Algunos podrían tener problemas para crecer o lograr hitos del desarrollo durante la infancia. También es importante el momento en que las madres comienzan a tomar ciertas ARV.

Cuando un bebé queda expuesto al VIH y a las ARV en el vientre de la madre o al nacer, este hecho se convierte en parte de sus antecedentes médicos. Es importante continuar haciendo el seguimiento de su salud conforme crece y se convierte en adulto.



¿Qué puede hacer usted?



Pregunte a su médico cuáles ARV son las más seguras para usted y para su bebé y la manera de tomarlas correctamente.



Interceda por mejores servicios y mejores investigaciones para las madres que viven con el VIH y sus hijos. Comuníquese con el coordinador del estudio para unirse a la Junta Asesora Comunitaria del Estudio de cohortes de VIH/SIDA pediátrico (Pediatric HIV/AIDS Cohort Study, PHACS) o únase a otra organización de intercesión de su localidad.